

ri necesse est gradus XXVII, puncta L, ex
CCCLX totius circuli æquinoctialis. Hi sunt
itaque gradus, & puncta, prout in sphæra cor
porea positum est, ex gradibus æquinoctialis
circuli, cum quibus IIII signa circumposita
punctis æquinoctialibus in sphæra aplanete sic
oriuntur. Possumus autem & leniori modo
ad hoc peruenire. Quanta enim Ke in e n , tan
ta e b in e d . Est autem b e in e d partes
IIIMDC, quod cum diuisum fuerit per li
neam e K , colligitur linea e n . itaque notam
esse constans est. quam quoniam Ke superat
duplo lineæ fe : pariter & fe notam esse con
sequens est. Est autem e t nota, quoniam re
cto angulo apud f opponitur: erit & angulus
 ft e notus, angulo uidelicet Ke b æqualis,
quam arcus ipsius b m notitia consequitur.

Simili modo metiri licet sequentium or
tum, ut si ponamus arcum decliuis circuli b
 K , arcum duorum signorum, quousque pun
ctum K notet principium aquarii: punctumq;
I principium sagittarii, quorum opposita per
diametron, n quidem caput leonis, y uero
principium geminorum. Cæteris itaque simi
li modo productis, remanebunt K t & t e eiuf
dem