

ctis XVI, ex CCCLX totius circuli triangu-
lum e t y continentis. Ex gradibus ergo,
quos in quatuor rectis angulis numeramus
CCCLX, habebit angulus e t y gradus VIII,
puncta XXXVIII ex CCCLX totius circuli
æquinoctialis. Quoniam ergo, ut supra di-
ctum est, unumquodque ex quatuor signis
circa puncta æquinoctialia in sphaera aplane-
te oritur cum gradibus XXVII, punctis L:
cum de hac summa hos gradus VIII cum
punctis XXXVIII subtraxeris: relinquetur
numerus ortus arietis, ortusq; piscium in hoc
climate: gradus scilicet XIX, puncta XII.
si uero eosdem gradus VIII cum suis pun-
ctis supraposita summæ adiciamus: accre-
scet numerus ortus uirginis, ortusq; libræ:
gradus uidelicet XXXVI puncta XXVIII.

Simili exemplo metiri licet & sequentium
ortum: ut si refecemus arcum b t, ad quanti-
tatem duorum signorum: piscium, & aqua-
rii, quousque & cætera modo superiori per-
ficiantur. unde lineam e t, ut pote semidia-
metrum æquidistantis circuli designati ad ca-
put aquarii accrescere necesse est, quousque
partes quidem LXXXVI, puncta XXI, se-
cunda